

Behandlungsplan für das allergische Kind



Groupement des Pédiatres Immunologues / Allergologues Suisses
Arbeitsgruppe Pädiatrische Immunologie / Allergologie Schweiz
Gruppo dei Pediatri Immunologi / Allergologi Svizzeri

Datum :

| | | |
|------|---------|--------------|
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|------|---------|--------------|

STRIKT ZU VERMEIDENDE LEBENSMITTEL

- Striktes Meiden aller Nussarten**
(Baumnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashewnüsse, Paranüsse, Macadamianüsse, Pecannüsse), dies bedeutet auch, wenn bezeichnet steht « kann Spuren von ...enthalten », sowie Nussöl. (*Kokosnuss und Muskatnuss sind erlaubt*)
- Striktes Meiden von Erdnüssen**
Ebenfalls wenn bezeichnet steht « kann Spuren von...enthalten ». (*Erdnussöl und Pflanzenöle sind erlaubt*)
- striktes Meiden anderer Lebensmittel**
-

BEHANDLUNG IM FALLE EINER ALLERGISCHEN REAKTION

| Reaktion | Symptome | Behandlung | Dosis |
|--|---|---|--|
| Leichte generalisierte allergische Reaktion | <ul style="list-style-type: none"> • Juckreiz • Hautausschlag • Schwellung im Gesicht oder der Lippen • Kribbeln im Mund • Bauchschmerzen | Antihistaminikum : | Wiederholen, wenn nach 2Std. keine Besserung eintritt |
| Starke generalisierte allergische Reaktion | <ul style="list-style-type: none"> • Husten • Mühe beim Schlucken, beim Sprechen, beim Atmen • Pfeifende Atemgeräusche • Asthmaanfall und /oder Atemnot • Blutdruckabfall • Bewusstlosigkeit, Kollaps | Injektion intramuskulär: <ul style="list-style-type: none"> • Epipen[®] /Anapen[®] oder Epipen[®] Jr /Anapen[®] Jr • Notruf 144 • <i>liegende Position, Beine hoch, Kopf tief</i> <i>Im Fall von Bewusstlosigkeit: Seitenlagerung des Kindes</i> | 1 Injektion Bei ungenügendem Ansprechen nach 5-10 Min. wiederholen |

Andere Behandlungen :

Bemerkungen :

Name des Arztes und Unterschrift: